


キイトルーダ®の副作用として予測される症状



頭痛 下垂体機能障害、脳炎・髄膜炎など
意識がうすれる 1型糖尿病、脳炎・髄膜炎など

見え方の異常 ぶどう膜炎
まぶたが重い・顔の筋肉が動きにくくなる 重症筋無力症

口の中や喉が渴きやすい・多飲 1型糖尿病
歯ぐきや口内の出血 免疫性血小板減少性紫斑病
くしゃみ 点滴時の過敏症反応
声のかすれ 甲状腺機能障害など
くちびるのただれ 重度の皮膚障害

咳 間質性肺疾患、心筋炎
息切れ・呼吸困難 間質性肺疾患、ギラン・バレー症候群、重症筋無力症、点滴時の過敏症反応、心筋炎、溶血性貧血、赤芽球癆など
胸の痛み 心筋炎

吐き気やおう吐 大腸炎、副腎機能障害、脳炎・髄膜炎、1型糖尿病など
食欲不振 肝機能障害、肝炎、下垂体機能障害、副腎機能障害など

下痢 大腸炎など
ネバネバした便・血便 大腸炎
便秘 甲状腺機能障害、副腎機能障害
腹痛 大腸炎、膵炎、1型糖尿病、硬化性胆管炎
トイレが近い 1型糖尿病
血尿 腎機能障害、免疫性血小板減少性紫斑病
尿量の減少 腎機能障害

手足に力が入らない ギラン・バレー症候群、筋炎・横紋筋融解症、重症筋無力症
手指のふるえ 甲状腺機能障害など

全身

発熱 間質性肺疾患、大腸炎、腎機能障害、重度の皮膚障害、心筋炎など
疲れやすい・だるい 大腸炎、肝機能障害、肝炎、甲状腺機能障害、副腎機能障害など
黄疸 肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎、膵炎、溶血性貧血
発疹などの皮膚症状 点滴時の過敏症反応、重度の皮膚障害、免疫性血小板減少性紫斑病、硬化性胆管炎など
体重の減少 副腎機能障害、1型糖尿病など
体重の増加 甲状腺機能障害、腎機能障害
むくみ 甲状腺機能障害、腎機能障害、心筋炎
けいれん 脳炎・髄膜炎
しびれ ギラン・バレー症候群

このほか、気になる症状があらわれた場合には、治療日記に記入していき、次回診察時に担当の医師に、お伝えください。

