

キイトルーダ®の副作用として予測される症状

頭痛 下垂体機能障害、脳炎・髄膜炎、心筋炎、点滴時の過敏症反応

意識障害 1型糖尿病、脳炎・髄膜炎

眼の動きが悪い ギラン・バレー症候群、重症筋無力症

まぶたのむくみ 甲状腺機能障害

見え方の異常 下垂体機能障害、ぶどう膜炎

まぶたが重い・顔の筋肉が動きにくくなる 重症筋無力症

口の中や喉が渇きやすい・多飲 1型糖尿病、下垂体機能障害

歯ぐきや口内の出血 免疫性血小板減少性紫斑病

くしゃみ 点滴時の過敏症反応

声のかすれ 甲状腺機能障害

くちびるのただれ 重度の皮膚障害


咳 間質性肺疾患、心筋炎

呼吸困難 間質性肺疾患、ギラン・バレー症候群、重症筋無力症、点滴時の過敏症反応、心筋炎、溶血性貧血、赤芽球癆など

胸の痛み 心筋炎

吐き気やおう吐 大腸炎、肝機能障害、肝炎、副腎機能障害、点滴時の過敏症反応、脾炎、脳炎・髄膜炎、1型糖尿病、心筋炎

食欲低下 大腸炎、肝機能障害、肝炎、副腎機能障害



下痢 大腸炎、副腎機能障害など

ネバネバした便・血便 大腸炎

便秘 甲状腺機能障害、副腎機能障害

腹痛 大腸炎、脾炎、1型糖尿病、副腎機能障害、硬化性胆管炎

トイレが近い 下垂体機能障害、1型糖尿病

尿量の減少 腎機能障害

手足の筋力低下 ギラン・バレー症候群、重症筋無力症

手指のふるえ 甲状腺機能障害など

全身

発熱 間質性肺疾患、腎機能障害、1型糖尿病、重度の皮膚障害、心筋炎など

疲れやすい・だるい 肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎、甲状腺機能障害、副腎機能障害、溶血性貧血、赤芽球癆など

黄疸 肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎、脾炎、溶血性貧血

発疹などの皮膚症状 点滴時の過敏症反応、重度の皮膚障害、腎機能障害、免疫性血小板減少性紫斑病、硬化性胆管炎など

体重の減少 副腎機能障害、1型糖尿病など

体重の増加 甲状腺機能障害

むくみ 腎機能障害

しびれ ギラン・バレー症候群

けいれん 脳炎・髄膜炎

月経がない・乳汁分泌 下垂体機能障害

このほか、気になる症状があらわれた場合には、治療日記に記入しておき、次回診察時に担当の医師に、お伝えください。

