

キイトルーダ®と化学療法±ペバシズマブの併用治療 治療の注意点③

治療中に以下のような症状や気になる体調の変化、
困ったことなどがあれば、
すぐに医師や看護師、薬剤師にご相談ください

* パクリタキセルおよびシスプラチンまたはカルボプラチン

キイトルーダ®と化学療法*±ペバシズマブの副作用として予測される症状



- 見え方の異常
- まぶたが重い・顔の筋肉が動きにくくなる
- ものが二重に見える



- 頭痛
- 意識がうすれる
- めまい
- 脱毛
- 耳鳴り



- 口の中や喉が渇きやすい・多飲
- 歯ぐきや口内の出血
- 口内炎
- 鼻血
- くしゃみ
- くちびるのただれ
- 喉の痛み



- 吐き気やおう吐
- 食欲不振



- 咳
- たん・血たん
- 息切れ・呼吸困難・動悸
- 胸の痛み



- 下痢
- ネバネバした便・血便
- 油が浮いたり、すっぱいにおいのする柔らかい便が出る
- 便秘
- 腹痛
- お腹が張る
- トイレが近い
- 血尿
- 尿量の減少・尿が出にくい
- 尿の泡立ち



- 手足に力が入らない
- 手指のふるえ



全身

- 発熱
- 寒気
- 疲れやすい・だるい
- 黄疸
- 発疹などの皮膚症状
- 点状や斑状のおおあざ
- 血圧の左右差
- おおあざができる
- 出血が止まりにくい
- 体重増加
- むくみ
- けいれん
- 高血圧
- 低血圧
- 体重減少
- しびれ
- 関節・筋肉の痛み
- 傷の治りが遅くなる†

† : ペバシズマブでのみ予測される症状

キイトルーダ®, パクリタキセル, シスプラチン, カルボプラチン, ペバシズマブの患者向医薬品ガイドおよび電子添文

記載の症状やその他気になる体調の変化がある場合は、すぐに医師や看護師、薬剤師にご連絡ください。

