

キイトルーダ®と化学療法の併用治療 治療の注意点③

治療中に以下のような症状や気になる体調の変化、困ったことなどがあれば、
すぐに医師や看護師、薬剤師にご相談ください。

キイトルーダ®の副作用として予測される症状



- 見え方の異常
- まぶたが重い・顔の筋肉が動きにくくなる




- 口の中や喉が渇きやすい・多飲
- 歯ぐきや口内の出血
- くしゃみ
- 声のかすれ
- くちびるのただれ



- 咳
- たん・血たん
- 息切れ・呼吸困難
- 胸の痛み



- 手足に力が入らない
- 手指のふるえ



- 頭痛
- 意識がうすれる



- 吐き気やおう吐
- 食欲不振



- 下痢
- ネバネバした便・血便
- 便秘
- 腹痛
- トイレが近い
- 血尿
- 尿量の減少・尿が出にくい

全身



- | | | |
|-------------|-------------|--------|
| ● 発熱 | ● 発疹などの皮膚症状 | ● むくみ |
| ● 疲れやすい・だるい | ● 体重減少 | ● けいれん |
| ● 黄疸 | ● 体重増加 | ● しびれ |

記載の症状やその他気になる体調の変化がある場合は、すぐに医師や看護師、薬剤師にご連絡ください。

